



UNIDAD PARA EL MANEJO DE LA ROYA DEL CAFE

INCIDENCIA DE LA ROYA DEL CAFÉ EN ZONAS CON REGISTROS ACTUALIZADOS DE LA ENFERMEDAD DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO DEL 2018

En los registros de incidencia de la roya del café, realizados en parcelas centinelas representativas de las regiones y con datos actualizados en el Sistema de Alerta Temprano se presentan las siguientes situaciones.

La Sierra, en la provincia de Santiago

Jamamú

Riesgo moderado


Los Cercadillos

Riesgo moderado

Las Placetas

Riesgo bajo


De acuerdo con Onamet, existe 65% de probabilidades de que las precipitaciones se mantengan cerca de la normal, y debido al comportamiento estacional de la roya se espera un incremento de la incidencia a partir de la segunda semana del mes de abril. Se recomienda monitoreo quincenal y disponer de fungicidas preventivos y curativos en la zona.



Región Valdesia en la provincia Peravia,

Riesgo Alto

De acuerdo con Onamet, existe 65% de probabilidades de que las precipitaciones se mantengan cerca de la normal, y debido al comportamiento estacional de la roya se recomienda la aplicación de fungicidas sistémicos especialmente en los focos donde se ha completado la primera floración o floración loca monitoreo quincenal y disponer de fungicidas preventivos y curativos en la zona



Rancho Arriba y Los Anones en la provincia San José de Ocoa

Productora Camilo

Riesgo Moderado


Los Anones

Riesgo Bajo

Mahoma

Riesgo Bajo

De acuerdo con Onamet, existe 65% de probabilidades de que las precipitaciones se mantengan cerca de la normal, y debido al comportamiento estacional de la roya se espera un incremento de la incidencia a partir de la segunda semana del mes de abril. Se recomienda monitoreo quincenal y disponer de fungicidas preventivos y curativos en la zona




Suroeste de la Cordillera Central,
Provincia San Juan de la Maguana

Riesgo Alto

De acuerdo con Onamet, existe 65% de probabilidades de que las precipitaciones se mantengan cerca de la normal, y debido al comportamiento estacional de la roya se recomienda la aplicación de fungicidas curativos especialmente en los focos donde ha concluido la floración

Pluviometría y curva de comportamiento de la roya en Vertiente Suroeste Cordillera Central, Provincia Sn Juan de la Maguana



Provincias Bonao y zona Baja de la Provincia La Vega

Bonao (Los Guazaros) Riesgo Moderado

Zona Baja La Vega Riesgo Alto

En las zonas con riesgo moderado se recomienda el monitoreo quincenal y la aplicación de fungicidas en los focos donde haya concluido la floración. Esperar 60 días después de la floración, monitorear y aplicación de un fungicida sistémico

INCIDENCIA DE LA ROYA DEL CAFÉ EN ZONAS CON REGISTROS ACTUALIZADOS DE LA ENFERMEDAD DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-
MARZO DEL 2018

REGIONES	PARCELA CENTINELA	ALTITUD (msnm)	ENERO	FEBRERO	MARZO	FENOLOGIA	CONDICIONES CLIMATICAS*	NIVEL DE RIESGO	RECOMENDACIONES**
			% roya	% roya	% roya				
Norte: Zona La sierra	Jamamu	850	13.5	15.41	17.5	Fin de cosecha	Temp Máxima promedio: 29. Temp. Mínima 13.0. Amplitud térmica = 15.0. Humedad relativa= 70.5%	Moderado	Realización de las prácticas culturales, Poda, control de malezas, y monitoreo de la roya
	Las Placetas	950	13.88	13	4.72	Fin de cosecha		Bajo	
	Los Cercadillos	1080	27.1	27.3	15.8	Fin de cosecha		Moderado	
Central: San José de Ocoa: Yuna							Temp Máxima promedio> 29.0. Temp. Mínima 17. Amplitud térmica = 12.		Realización de las practicas culturales, Poda, control de malezas, y monitoreo de la roya
	Productora Camilo	1000		9.57	6.02	Fin de cosecha		Moderado	
	Los Anones	950		1.69	0.32	Fin de cosecha		Bajo	
	Mahoma	950			0.68	Fin de cosecha		Bajo	
Central: Región Valdesia	El Manaclar	1050	57.9	52	34.3	Floración	0Temp Máxima promedio> 29.7. Temp. mínima 17. Amplitud térmica = 12.0	Alto	Realización de las prácticas culturales, Poda, control de malezas, y monitoreo de la roya. Aplicación de fungicidas en los focos donde haya concluido la floracion
	El Manaclar	1150	57.16	52.5		Floración		Alto	
Regional Sur: Zona Polo		900			49	Floración	Temp Máxima promedio> 32.0. Temp. mínima 18.0. Amplitud térmica =	Atto	Realización de las practicas culturales, Poda, control de malezas, y monitoreo de la roya

Tabla con formato

							14.0.		
Regional Suroeste: Zona San Juan	Los Montacitos	1120		52	40	Floración	Temp Máxima promedio> 31.0. Temp. mínima 17.0. Amplitud térmica = 14.0.	Alto	Realización de las practicas culturales, Poda, control de malezas, y monitoreo de la roya
	El Naranjito	990		54	41	Floración			
	Arroyo Cano	1278		57	42	Floración			
Regional Norcentral	Bonao (Los Guazaro)	900			16.6	Floración	Temp Máxima promedio> 31.0. Temp. mínima 13.0. Amplitud térmica = 18.0.	Moderado	Realización de las prácticas culturales, Poda, control de malezas, y monitoreo de la roya
	La Vega	500		13	22	Floración		Alto	

* Estas informaciones climáticas son las registradas en los mapas de Temperaturas Máximas y Mínimas publicados por la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet)

**** CONSULTE CON EL TECNICO DEL INDOCAFE QUE LE QUEDE MAS CERCANO**